

MODERNA

v.

PFIZER

v.

JANSSEN

SO SÁNH 3 VẮC XIN KHÁC NHAU

- Tỷ lệ hiệu quả: 94.1%
- Thích hợp cho người 18 tuổi trở lên
- Phát triển vắc-xin với sự hợp tác của Viện Dị ứng và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia

Cần chích hai 100-microgram mũi. Mũi thứ hai 28 ngày sau mũi thứ nhất

Mũi thứ hai quan trọng để đạt mức độ miễn dịch cao.

Vận chuyển ở -4 °F, bằng nhiệt độ của tủ đông

Có thể để trong tủ lạnh 30 ngày trước khi hết hạn sử dụng

Chỗ chích bị sưng, nhức, hay nhiễm trùng
Mệt mỏi
Nhức đầu
Nhức mỏi cơ thể (đau cơ bắp & khớp)
Ớn lạnh
Bị cảm, cúm
Buồn nôn

- Tỷ lệ hiệu quả: 95%
- Thích hợp cho người 16 tuổi trở lên
- Vắc xin được phát triển độc lập,

Cần chích hai 30 mg mũi. Mũi thứ hai 21 ngày sau mũi thứ nhất

Mũi thứ hai quan trọng để đạt mức độ miễn dịch cao.

Vận chuyển ở -94 °F, cần lưu trữ trong ngăn đá cực lạnh và đá khô

Vắc xin Pfizer chỉ được lưu trữ trong tủ lạnh trong vòng 5 ngày trước khi hết hạn

Chỗ chích bị sưng, nhức, đau, hay nhiễm trùng
Mệt mỏi
Nhức đầu
Nhức mỏi cơ bắp
Đau khớp
Bị cảm, cúm
Ớn lạnh
Buồn nôn
Sưng hạch bạch huyết

- Tỷ lệ hiệu quả: 66.3%
- Thích hợp cho người 18 tuổi trở lên
- Phát triển bởi công ty Johnson & Johnson

Cần một mũi (0.5 mL)

Vận chuyển từ 36-46°F, không để đông đá

Lưu trữ trong ngăn lạnh tới khi ngày hết hạn hoặc sau 6 tiếng dùng

Lưu trữ trong nhiệt độ phòng mạch khoảng 2 tiếng

Chỗ chích bị sưng, nhức, đau, hay nhiễm trùng
Mệt mỏi
Nhức mỏi cơ thể (đau cơ bắp & khớp)
Injection site swelling and soreness
Nhức đầu